

Dulco-Laxo® comprimidos

Bisacodilo

Composición

Cada comprimido recubierto contiene:

Bisacodilo5 mg

Excipientes:

Sacarosa, lactosa, almidón de maíz, glicerol (E-422), estearato de magnesio, talco, goma arábiga, dióxido de titanio (E-171), Eudragit L, Eudragit S, ftalato de dibutilo, macrogol 6000, óxido de hierro amarillo (E-172), cera blanca, cera carnauba y goma lacac.s.

Forma farmacéutica y contenido del envase

Envases con 30 comprimidos recubiertos

Actividad

Laxante por contacto directo con la mucosa del intestino.

Titular y fabricante

Titular:

Boehringer Ingelheim España, S.A.
Prat de la Riba, s/n
Sector Turó de Can Matas
08190 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

Fabricante:

Boehringer Ingelheim Francia, Sarl.
12, Rue André Huet
51060 Reims- Cedex (Francia)

Indicaciones

Alivio sintomático del estreñimiento, como el producido por reposo prolongado en cama, viajes y para facilitar la evacuación intestinal en caso de hemorroides y fisuras de ano.

Contraindicaciones

- Obstrucción intestinal
- Apendicitis o su sintomatología (náuseas, vómitos, calambres, dolor de estómago o parte inferior del abdomen) o procesos inflamatorios intestinales no diagnosticados
- Hemorragias gastrointestinales
- Alergia a alguno de sus componentes

Precauciones

Evitar su uso continuado. No utilizar más de 6 días sin consultar al médico.

Interacciones

Debe evitarse la ingestión simultánea de DULCO-LAXO comprimidos con leche o medicamentos antiácidos. Caso de tomar alguna medicación de este tipo, hágalo dos horas después de la toma de DULCO-LAXO comprimidos.

Si está tomando otra medicación consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este preparado.

Advertencias

Advertencias sobre excipientes

Este medicamento, por contener glicerol como excipiente, puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

Embarazo y lactancia

Las mujeres en período de lactancia deben consultar al médico antes de utilizar este medicamento

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

Efectos sobre la capacidad de conducción

No se han descrito.

Uso en niños

En niños menores de 10 años, debe administrarse exclusivamente bajo control médico.

Uso en ancianos

En personas ancianas pueden producirse mayores efectos y debilidad.

Posología

Adultos: 1 a 2 comprimidos tomados por la noche

Niños mayores de 10 años: 1 comprimido

Niños menores de 10 años: consultar al médico

Instrucciones para la correcta administración

Los comprimidos de DULCO-LAXO se tragan sin masticar, con ayuda de un poco de líquido (no leche).

Sobredosificación y tratamiento

Por administración de dosis excesivas, podrían presentarse algunos de los siguientes síntomas: espasmos gastrointestinales, deposiciones mucosas y diarreicas, pérdida de potasio o de otros electrolitos.

Las medidas terapéuticas consisten en espasmolíticos, administración de sales potásicas, rehidratación y tonificación de los vasos periféricos.

En caso de ingestión accidental, acuda a un centro médico indicando el producto y la cantidad ingerida o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Reacciones adversas

- Efectos laxantes excesivos con pérdida de agua y electrolitos, acompañados de calambres abdominales, tras la administración de dosis elevadas.
- Erupciones cutáneas, cansancio o debilidad.

Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

Caducidad

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Otras presentaciones

Envases con 6 supositorios

Texto revisado: Marzo 2000

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

a bcd